



Maister

Ugraset forsvinner...

- så enkelt er det!



BAYER AGRO APP

Få informasjon, nyheter og hjelp med Bayers app

Skann koden eller sende en SMS med teksten BAYER APP til 2140



Bayer CropScience

MaisTer[®] - allsidig virkning mot ugras

Vi lanserer nå et helt nytt produkt mot ugras i fôrmais, juletrær og planteskoler. MaisTer WG virker godt mot både grasugras og tofrøbladet ugras.

MaisTer er et lavdosemiddel med to aktive stoffer som er fullt systemisk. Opptak skjer i hovedsak gjennom blad, jordfuktigheten ved behandling er derfor av mindre betydning. Ved sprøyting transporteres produktet rundt i hele planten. Etter få dager slutter ugraset å vokse, deretter ser man gulning og etter 7-20 dager vil ugraset visne ned. **MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero**, se etikett for mer informasjon.

	Dose MasiTer per daa			
	5 g	7,5 g	10 g	15 g
Torfrøbladet ugras				
Då				
Åkerminneblom				
Gullkrage				
Jordrøyk				
Gjetertaske				
Pengeurt				
Åkersennep/raps				
Vassarve				
Svartsøtvier				
Balderbrå				
Rødtvetann				
Rødt Hønsegras/vanlig hønsegras				
Åkerstemor				
Meldestokk				
Klengemaure				
Tungras				
Storkenebb				
Vindelslirekne/Veronika				
Grasugras				
Tunrapp				
Floghavre				
Raigras				
Hønsehirse				
Kveke				

Meget god effekt	God effekt	Middels effekt - Øk dosen eller bland med aktuell partner	Noe effekt - Tilsett passende blandingspartner
------------------	------------	---	--

MaisTer[®] - mot ugras i fôrmais

I fôrmais sprøytes det så snart ugraset akkurat har spirt frem, og før det begynner å konkurrere med maisen. Tidlig sprøyting gir bedre virkning. Husk at MaisTer alltid skal brukes sammen med Mero!


Bruk maks 15 g MaisTer per dekar per år.

Vi anbefaler delt behandlingsstrategi i fôrmais:

1. behandling 5-10 g MaisTer + Mero
+ 30 ml Starane/Tomahawk
2. behandling 5-7,5 g MaisTer + Mero
+ 30 ml Starane/Tomahawk



Best effekt får man hvis første behandling utføres når ugraset har 2 frøblad eller når grasugraset har 2-3 blader. Følg deretter opp med neste behandling etter 10-14 dager. Delt behandling anbefales spesielt mot kveke eller der man kan forvente rask tilvekst (humusrik jord). Siste sprøyting må utføres før maisen har 8 blader.



For å redusere risikoen for utvikling av SU-resistens samt ved mistanke om SU-resistens anbefales det å blande MaisTer med fluroksypyr. Der vindelslirekne, veronika, tranehals eller storkenebb er problemugras må MaisTer brukes i kombinasjon med andre produkter. Se etiketten for mer informasjon.