



**Maister**



**Ugraset forsvinner...**  
- så enkelt er det!



**BAYER AGRO APP**  
Få informasjon, nyheter og  
hjelp med Bayers app

Skann koden eller sende en SMS  
med teksten BAYER APP til 2140



**Bayer CropScience**

# MaisTer<sup>®</sup> - allsidig virkning mot ugras

Vi lanserer nå et helt nytt produkt mot ugras i fôrmais, juletrær og planteskoler. MaisTer WG virker godt mot både grasugras og tofrøbladet ugras.

MaisTer er et lavdosemiddel med to aktive stoffer som er fullt systemisk. Opptak skjer i hovedsak gjennom blad, jordfuktigheten ved behandling er derfor av mindre betydning. Ved sprøyting transporteres produktet rundt i hele planten. Etter få dager slutter ugraset å vokse, deretter ser man gulning og etter 7-20 dager vil ugraset visne ned. **MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero**, se etikett for mer informasjon.

	Dose MasiTer per daa			
	5 g	7,5 g	10 g	15 g
<b>Torfrøbladet ugras</b>				
Då				
Åkerminneblom				
Gullkrage				
Jordrøyk				
Gjetertaske				
Pengeurt				
Åkersennep/raps				
Vassarve				
Svartsøtvier				
Balderbrå				
Rødtvetann				
Rødt Hønsegras/vanlig hønsegras				
Åkerstemor				
Meldestokk				
Klengemaure				
Tungras				
Storkenebb				
Vindelslirekne/Veronika				
<b>Grasugras</b>				
Tunrapp				
Floghavre				
Raigras				
Hønsehirse				
Kveke				


  

Meget god effekt	God effekt	Middels effekt - Øk dosen eller bland med aktuell partner	Noe effekt - Tilsett passende blandingspartner
------------------	------------	---	--

# MaisTer<sup>®</sup> - i juletrær og planteskoler

Sprøyt umiddelbart før knoppbryting og når ugraset er i god vekst, vanligvis fra siste halvdel av april til begynnelsen av mai. MaisTer vil ikke gjøre arealet helt rent for ugras, men vil være til god hjelp for å holde ugraset nede. Husk at MaisTer alltid skal brukes sammen med Mero!

MaisTer er testet og godkjent i følgende kulturer:	
Juletrær	Planteskoler
Nordmannsgran til juletrær og pyntegrønt-beplantninger.	Vanlig buskfuru (Pinus mugo)
	Bøk (Fagus sylvatica)
	Sommereik (Quercus robur)
	Nobilis (Abies procera)
	Nordmannsgran (Abies nordmanniana)
	Gran (Picea abies)
	Svartor (Alnus glutinosa)
	Sargentepple (Malus sargentii)
	Bjørkebladspirea (Spiraea betulifolia)
	Syrin (Syringa vulgaris)



## Juletrær og pyntegrønt

MaisTer kan brukes i nyplantninger. MaisTer må ikke brukes etter at knoppen er brutt.

## Planteskoler

I planteskoler må MaisTer kun benyttes i prikle bed. I sådde kulturer som bøk, eik og eple kan MaisTer brukes tidligst året etter at kulturen er sådd. MaisTer må ikke brukes etter at knoppen er brutt.

**Dosering:** bruk 15 g MaisTer + 200 ml Mero per dekar.

Kveke: Vær oppmerksom på at effekten på jordstengler er begrenset. Selv om alt overjordisk plantemateriale bekjempes og visner, kan man få ny fremspiring fra jordstenglene sent i sesongen. Dette har normalt ikke betydning for utviklingen av juletrærne.

Åkertistel: Planter som har spirt fram og er i vekst på behandlingstidspunktet vil bli bekjempet, men man må forvente ny gjenvekst.