

Front cover



**Confidor<sup>®</sup> WG 70**  
Imidakloprid  
Vannløselig granulat

**200 g**

Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl.  
i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Spesialpreparat for veksthus.

Reg.nr. 2018.64

UN 3077

**ADVARSEL**  
Farlig ved svelging.  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/  
Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.)  
Farlig for bier.  
Unngå innånding av støv/aerosoler.  
Vask hender og ansikt grundig etter bruk.  
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av preparatet.  
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege.  
Skyll munnen.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).  
Dette er et spesialpreparat for veksthus (se spesifikke krav under avfallshåndtering).




**AVGIFTSKLASSE: 1**



224092  
705628  
5

**Tilvirker:**  
Bayer AG  
D-51368 Leverkusen

**Importør:**  
Bayer AS  
Postboks 193  
N-1325 Lysaker  
Tlf. 91 14 71 60

Bayer

17-10-2018

<b>RIFMO</b>	<b>PMR: Bayer CropScience DK</b>	
	Form.: 200x70 mm	Date: 17-10-2018
	Artwork: 4940a	Country: NO
Job no.: 34-4325/3074	Colour: <b>CMYK</b>	<input type="checkbox"/> Use only for corrections <input checked="" type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Confidor® WG 70 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.**

#### **BRUKSOMRÅDE**

Confidor WG 70 er tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus.

#### **Behandlingsfrister:**

Sprøyting      Agurk, tomat, paprika                      3 dager

#### **VIRKEOMRÅDE**

Confidor WG 70 har meget god virkning mot agurkbladlus (*Aphis gossypii*), ferskenbladlus (*Myzus persicae*), betebbladlus (*Aphis fabae*), grønnflekke veksthusbladlus (*Aulacorthum solani*), mellus (*Trialetrodes vaporariorum*) og bomullsmellus (*Bemisia tabaci*). I tillegg har Confidor WG 70 virkning mot skjoldlus, ullus, biller (f.eks. jordloppe), minermøll, sikader, sugere, trips m. fl.

#### **VIRKEMÅTE**

Confidor WG 70 er et neonicotinoid med akutt giftig nerve- og magevirkning. Produktet er sterkt systemisk, transporteres rundt i planten og gir dermed også god beskyttelse av ny tilvekst. Confidor WG 70 er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Produktet har relativt lang virkningstid og har god effekt igjennom de ulike utviklingsstadier hos bladlus. For mellus må man forvente noe nedsatt virkning i det siste nymfestadiet hvor insektene ikke er aktive og dermed ikke tar til seg føde.

#### **RESISTENS**

Confidor 70 WG inneholder imidakloprid, som tilhører middelgruppe 4A: Neonicotinoider. Resistens mot imidakloprid er ikke påvist i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppe 4A: Neonicotinoider maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk kan bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Det maksimale antall behandlinger med Confidor 70 WG, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettleidingen, må ikke overskrides.

#### **NYTTEORGANISMER/INTEGRERT PLANTEVERN**

##### **Humler som brukes til bestøvning:**

Confidor WG 70 er skadelig for humler ved sprøyting. Dersom Confidor WG 70 tilføres via drypvanning kan det føre til en mindre effektiv bestøvning i opp til 10 dager etter behandling (repellerende effekt). Påvirkningen er doseavhengig.

##### **Øvrige nyttedyr:**

Ved drypvanning har Confidor WG 70 ingen direkte effekt på snylteveps, gallmygg og rovmidd.

**BRUKSRETLEDNING****Generelt**

I kulturer som får tilført vann og næring gjennom dryppvanningssystemer kan Confidor WG 70 blandes i vanningsvannet. Ved dyrkning på kunstig vekstmedium tas Confidor WG 70 raskere opp i plantene dersom behandlingen kan gjennomføres på et lettere uttørret vekstmedium.

Når det brukes dryppvanning skal det sikres at behandlingen gjennomføres som en sammenhengende og fullstendig avsluttet behandling. Det vil si at den avmålte mengde Confidoropløsning må være fullstendig tilført kulturen før tilførsel av ytterligere vanningsvann.

**Tillaging av sprøytevæske**

Fyll tanken med ½ til ¾ mengde med vann. Start omrøringen. Rist opp kannen med Confidor WG 70 og tilsett preparatet. Fyll resten av vannmengden i tanken. Start sprøytingen umiddelbart. Pass på at omrøringen er i gang også ved transport og eventuelle arbeidspåuser. Benytt minimum 50 l væske per daa.

**Behandlingstidspunkt og dosering:**

Kultur	Skadegjører	Dose	Merk
Agurk, tomat og paprika (dyrket på kunstig substrat)	Bladlus	3,5 g per 1000 planter	Behandling ved dryppvanning. Evt. etterfølgende behandling kan skje etter 7 dager. Maks 2 behandlinger per sesong.
	Mellus	14 g per 1000 planter	
Agurk, tomat og paprika	Bladlus	14-21 g per 1000 m <sup>2</sup> . Væskemengde: 100-150 liter per 1000 m <sup>2</sup> .	Behandling ved sprøyting. Evt. etterfølgende behandling kan skje etter 10-14 dager. Maks 2 behandlinger per sesong.
	Mellus		

**Optimale virkningsbetingelser**

Emne	Optimalt	Minimum
Temperatur	20-30° C	5-10° C
Luftfuktighet	60-90 %	-
Tørketid etter sprøyting	2-4 timer	1 time
Skadegjørere, utvikling	<b>Bladlus:</b> Alle stadier <b>Mellus:</b> Alle aktive larvestadier, voksne og egg	<b>Bladlus:</b> Alle stadier <b>Mellus:</b> Alle aktive larvestadier, voksne og egg
Virkingstid	<b>Bladlus:</b> Sprøyting: 2-4 uker Dryppvanning: 2-6 uker <b>Mellus:</b> Sprøyting: 1½-2 uker Dryppvanning: 2-4 uker	<b>Bladlus:</b> Sprøyting: 1-2 uker Dryppvanning: 2-4 uker <b>Mellus:</b> Sprøyting: 1 uke Dryppvanning: 2-4 uker

**BLANDING MED ANDRE MIDLER**

Confidor WG 70 kan blandes med en rekke insekt- og soppmidler, men vær oppmerksom på at blanding med andre preparater kan resultere i økt følsomhet hos kulturen. Der bør derfor gjennomføres en prøvebehandling på et mindre parti. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

**LAGRING**

Lagres tørt og kjølig.

**FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker fortrinnsvis av polykloropren, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Tilsølte klær må vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).**

**HÅNTERINGSFRIST**

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

**RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettedningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

#### **AVFALLSHÅNDTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesortertes. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjernet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene.

#### **MERK**

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group

9.2018

#### **Tilvirker:**

Bayer AG  
D-51368 Leverkusen

#### **Importør:**

Bayer AS  
Postboks 193  
N-1325 Lysaker  
Tlf. 91 14 71 60

**Bayer**



# Confidor<sup>®</sup> WG 70

Imidakloprid  
Vannløselig granulat

200 g

Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl.  
i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Spesialpreparat for veksthus.

Reg.nr. 2018.64

UN 3077

17-10-2018

#### ADVARSEL

Farlig ved svelging.  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/  
Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.)

Farlig for bier.  
Unngå innånding av støv/aerosoler.  
Vask hender og ansikt grundig etter bruk.  
Ikke spis, drikk eller royk ved bruk av preparatet.  
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege.  
Skyll munnen.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).  
Dette er et spesialpreparat for veksthus (se spesifikke krav under avfallshåndtering).



AVGIFTSKLASSE: 1

**Nettoinnhold: 200 g**

#### Sammensetning:

Imidakloprid..... 700 g/ kg  
Spred- og fyllstoffer..... 300 g/ kg

#### Behandlingsfrister:

Agurk, tomat, paprika 3 dager



#### Tilvirker:

Bayer AS  
D-51368 Leverkusen

#### Importør:

Bayer AS  
Postboks 193  
N-1325 Lysaker  
Tlf. 91 14 71 60

**Bayer**